



Guía para el tratamiento con linfocitos T-CAR contra el mieloma

¿Qué es el tratamiento con linfocitos T-CAR?

El tratamiento con linfocitos T-CAR es un tipo de inmunoterapia en la que se usan linfocitos T (un tipo de célula del sistema inmune que ayuda a combatir infecciones y el cáncer), de su propio cuerpo, para localizar y destruir las células del mieloma.



¿Cuáles son los pasos del tratamiento con linfocitos T-CAR?



Principales efectos secundarios del tratamiento con linfocitos T-CAR

EFECTO SECUNDARIO	SÍNTOMAS	APARICIÓN TRAS LA INFUSIÓN DE LINFOCITOS T-CAR	TIEMPO	TRATAMIENTOS
Síndrome de liberación de citocinas 	<ul style="list-style-type: none"> • Fiebre • Dificultad respiratoria • Mareos • Náuseas • Dolor de cabeza 	<ul style="list-style-type: none"> • Ritmo cardíaco acelerado • Presión sanguínea baja 	Entre 1 y 9 días	<ul style="list-style-type: none"> • Actemra (tocilizumab) • Corticoesteroides • Cuidados paliativos
Síndrome de neurotoxicidad asociada a células inmunoefectoras 	<ul style="list-style-type: none"> • Dolor de cabeza • Confusión • Alteración del habla 	<ul style="list-style-type: none"> • Convulsiones • Delirio • Inflamación cerebral 	Entre 2 y 9 días	<ul style="list-style-type: none"> • Medicamentos anticonvulsivos • Corticoesteroides

Informe a su equipo de atención médica si tiene fiebre que supere los 38 °C, escalofríos con temblores incluso sin fiebre, mareos, dificultad para respirar o presión sanguínea baja.



El tratamiento con linfocitos T-CAR puede causar un descenso en el recuento sanguíneo, sobre todo de los glóbulos blancos que combaten infecciones. Esto incrementa el riesgo de infecciones.



PREVENCIÓN DE INFECCIONES



Higiene y entorno



Vacunas



Medicamentos de prevención*

*Por ejemplo, tratamiento mensual con inmunoglobulina intravenosa o infiltración de factores de crecimiento.

La importancia de los cuidadores

Una manera importante en la que pueden ayudar los cuidadores durante el tratamiento con linfocitos T-CAR y después de este es monitoreando los efectos secundarios.

Después de la infusión de linfocitos T-CAR:

- Primeras 4 semanas: compruebe la presión sanguínea del paciente y su temperatura al menos 3 veces al día
- Primeras 8 semanas: permanezca disponible para conducir o realizar cualquier otra actividad en la que necesite estar alerta



Conozca los síntomas, efectos secundarios o cambios en la salud del paciente



Durante las visitas al equipo de atención médica: haga preguntas y tome notas



En caso de emergencia, llame al 911 e informe al equipo de atención médica



Asegúrese de que el o la paciente tiene consigo su tarjeta* para llevar en la billetera en todo momento y que esta se muestra a los doctores del hospital



*Tarjeta que se entrega a todos los pacientes que han recibido el tratamiento con linfocitos T-CAR para alertar a otros médicos de hospital de que el paciente ha recibido este tratamiento.

Apoyan este recurso:

abbvie

AMGEN

cure[®]
caretoday.com

Genentech
A Member of the Roche Group



Johnson & Johnson

Karyopharm[®]
Therapeutics

LEGEND
BIOTECH

Pfizer

REGENERON

sanofi



MULTIPLE MYELOMA
Research Foundation

2024 CART